

Le CLAT assure la **PRÉVENTION**,
le **TRAITEMENT** et l'**INFORMATION** par :

l'investigation autour des cas de tuberculose,

le dépistage des personnes à risque,

le suivi des patients tuberculeux et la délivrance de traitement à titre gratuit pour les personnes sans couverture sociale,

le suivi des patients porteurs d'une infection tuberculeuse latente,

la vaccination BCG,

NOTRE ÉQUIPE

- 1 médecin
- 2 infirmières,
- 1 secrétaire,
- 1 assistante sociale

AUTRES CONTACTS UTILES

Au CENTRE HOSPITALIER DE PAU

Centre de vaccination :

05 59 72 78 02

Permanence d'accès aux soins (PASS):

05 59 72 69 40

CLAT de la Côte Basque :


05 59 44 38 57

CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE

CLAT 64 BEARN ET SOULE

05 59 92 47 53

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h15
clat64-bearn-soule@ch-pau.fr



> merci de vous munir de votre carnet de santé et de vos radiographies pulmonaires si vous en avez.



4 Boulevard Hauterive
64 046 PAU cedex
www.ch-pau.fr
05 59 92 48 48

CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE CLAT 64 BEARN ET SOULE



05 59 92 47 53

LA TUBERCULOSE


est due à une mycobactérie, le Bacille de Koch (BK).

Elle peut toucher tout l'organisme mais atteint le plus souvent les poumons.

La tuberculose **pulmonaire** est **contagieuse**.

LES SIGNES de la tuberculose (maladie) sont plus ou moins marqués

- Toux
- Crachats sanglants
- Fièvre
- Fatigue
- Sueurs nocturnes
- Perte de poids
- Perte d'appétit



LA TRANSMISSION est aérienne.

Une personne malade rejette du BK dans l'air lorsqu'elle tousse ou parle..

Lors de **contacts répétés, réguliers, rapprochés** avec une personne malade, on peut respirer du BK.



Certaines personnes ont plus de risque

L'INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

Si on respire du BK, nos défenses immunitaires l'élimine et on guérit, dans la plupart des cas.

> C'est l'**INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE**.
On n'est **pas contagieux**

MAIS parfois, le BK n'est pas totalement éliminé. Il reste « endormi ».

Et si un jour, les défenses immunitaires diminuent et la tuberculose (maladie) peut se développer.

LE TRAITEMENT

de la TUBERCULOSE (maladie)

6 mois de traitement minimum,
à prendre tous les jours
avec une surveillance médicale régulière.



de l'**INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE**

3 mois de **TRAITEMENT PRÉVENTIF** pour éviter que la maladie se développe, avec un suivi médical régulier;
ou une surveillance radiologique.

LE DEPISTAGE= test + radiographie pulmonaire

◇◇ DE L'INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

Par un test cutané ou sanguin à contrôler 3 mois après le dernier contact avec une personne atteinte de tuberculose pulmonaire



◇◇ DE LA TUBERCULOSE (maladie)

Par une radiographie thoracique
Par des analyses de crachats si la radiographie est anormale



→ QUI DÉPISTER ?

- ◇◇ Les personnes en contact régulier, répété et rapproché avec un patient tuberculeux
- ◇◇ Les personnes fragiles
- ◇◇ Les personnes à risque

