Quand vacciner l'entourage?

Pour mieux protéger le nourrisson et la femme enceinte, il est recommandé que l'entourage du nourrisson soit vacciné le plus tôt possible avant tout contact, au moins un mois avant la naissance.

Concernant la coqueluche :

En l'absence de vaccination de la mère pendant la grossesse, les adultes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourisson doivent avoir reçu un vaccin coqueluche (DTPC) datant de moins de 10 ans. Pour la fratie, un rappel à l'âge de 6 ans ou entre 11 et 13 ans est préconisé selon les recommandations en vigueur.

Où se faire vacciner?

▲ Chez votre médecin qu'il soit généraliste, gynécologue ou pédiatre.

▲ Auprès de votre sage-femme :

Dans le cadre du suivi gynécologique et pendant la grossesse, la sage-femme est autorisée à prescrire et pratiquer la vaccination de toutes les femmes ainsi que de l'entourage de la femme enceinte jusqu'à 8 semaines après l'accouchement.

▲ Au Centre de Vaccination de l'hôpital :

Le Centre Hospitalier de Pau dispose d'un service public gratuit de vaccination ouvert à tous





Centre de vaccination
Bâtiment HAUTERIVE
4, Boulevard HAUTERIVE
64046 Pau Cedex

0 05 59 72 78 02

□ vaccination64@ch-pau.fr
 □ vaccination64@ch-pau.fr





VACCINATION

dans l'entourage du nourrisson

Centre Hospitalier de Pau



www.ch-pau.fr Rubrique : Centre de vaccination

Vous attendez un enfant ou envisagez de devenir parent ?

Prenez le temps de vérifier et mettre à jour vos vaccins pour protéger vos enfants et vousmême contre les maladies infectieuses.

QUI EST CONCERNÉ?

- ▲ La future maman afin qu'elle puisse transmettre les anticorps au nourrisson. Certains vaccins sont à éviter pendant la grossesse, d'où l'importance de faire le point avant d'être enceinte.
- ✓ Toutes les personnes vivant sous le même toit que l'enfant ainsi que celles chargées de sa garde régulière ou fréquentant régulièrement son domicile.

L'objectif est d'éviter de transmettre au nouveauné des maladies infectieuses qui sont souvent beaucoup plus graves dans les premiers mois de vie.

Vacciner la future maman et son entourage proche, c'est protéger le nourrisson dès les premiers mois de sa vie.



Se vacciner : contre quelles maladies ?

La vaccination avant ou pendant la grossesse permet d'assurer la protection des femmes et du nourrisson par les anticorps maternels, en atten dant que celui-ci ait atteint l'âge d'être vacciné à son tour. Les vaccinations autorisées concernent notamment des maladies respiratoires.

LA COQUELUCHE

La coqueluche reste une des premières causes de décès par infection bactérienne communautaire chez le nourrisson de moins de trois mois. Dans la majorité des cas, la personne à l'origine de la contamination est un parent.

LA ROUGEOLE, LES OREILLONS, LA RUBEOLE

Contracter une de ces infections pendant la grossesse peut entraîner, chez la femme enceinte, des formes graves, des fausses couches et chez l'enfant des complications neurologiques sévères.

LA VARICELLE

Les conséquences d'une varicelle déclarée au cours de la grossesse **dépendent du mois de gestation**: malformations congénitales (en cas d'infection dans les quatre premiers mois) ou varicelle grave à la naissance (en cas d'infection autour de l'accouchement).

LA GRIPPE ET LA COVID-19

La grippe et le Coronavirus peuvent **entrainer des complications respiratoires graves** pouvant conduire à l'hospitalisation, surtout pendant les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de grossesse.

Quand vacciner la future maman?

AVANT LA GROSSESSE

- □ Coqueluche (DTCP)
- Rougeole Oreillons Rubéole (vérifier que 2 injections ont été faites)
 - ☐ Varicelle (si la patiente n'a pas eu la varicelle)

PENDANT LA GROSSESSE

- ☐ Coqueluche (DTCP) ¹
 - ☐ Grippe ^{1 et 2}
 - Covid-19 ^{1 et 3}

APRÈS LA GROSSESSE (MÊME CHEZ UNE FEMME ALLAITANTE)

- □ Coqueluche (DTCP)
- Rougeole Oreillons Rubéole (vérifier que 2 injections ont été faites)
- ☐ Varicelle (si la patiente n'a pas eu la varicelle)

Calendrier des vaccinations 2022 - diffusé le 20/04/2022

² Vaccination vivement recommandée aux femmes enceintes quel que soit le terme. Ce vaccin est sans danger pour le bébé.

³ DGS Urgent 2022-30 - diffusé le 22/02/2022. Vaccin ARNm actuellement préconisé